

(6) 宫腔镜检查：观察子宫腔形态、内膜的色泽和厚度、双侧输卵管开口、是否有宫腔粘连、畸形、息肉、黏膜下肌瘤等病变。

(7) 腹腔镜检查：可与宫腔镜手术同时进行，用于盆腔情况的检查诊断，直视下观察子宫附件的大小和形态、输卵管形态，以及有无盆腔粘连，可以同时进行盆腔粘连分离术和子宫内膜异位囊肿剔除术或病灶电灼术、子宫肌瘤剔除术、输卵管疏通术等手术治疗可恢复盆腔正常状态，极大地提高了妊娠机会。



禅医官方微信号
Official Wechat

地址：广东省佛山市石湾三友南路3号

官方网站：www.fsccyy.com

参考资料：妇产科学（人民卫生出版社 第8版）



制作日期：2017年6月

编码：ZXYJHK-折页-中文-061-01

中西医结合科制作

不孕症科普知识



咨询热线：0757-82263333



佛山市禅城中心医院
Foshan Chancheng Central Hospital

不孕症是一组由多种病因导致的生育障碍状态，是育龄夫妇的生殖健康不良事件。女性无避孕性生活至少12个月而未孕，成为不孕症，在男性则成为不育症。不孕症分为原发性和继发性两大类，既往从未有过妊娠史，无避孕而从未妊娠者为原发不孕；既往有过妊娠史，而后无避孕连续12个月未孕，称为继发不孕。不孕症发病率因国家、民族和地区不同存在差别，我国不孕症发病率约为10%。



引起不孕症的原因 >>

1、女性不孕因素

- (1) 盆腔因素：如盆腔粘连、输卵管阻塞、子宫内膜异位症等。
- (2) 排卵障碍
- (3) 免疫因素

- (4) 生殖道异常
- ### 2、男性不育因素
- (1) 精液异常
 - (2) 性功能异常
 - (3) 免疫因素

3、不明原因不孕：指目前医学尚未能检查出来明确原因的不孕症，约占不孕病因的10%。



不孕症相关检查 >>

通过男女双方全面检查找出不孕原因是诊断不孕症的关键。

1、男方检查

- (1) 体格检查：包括全身检查和局部生殖器检查。
- (2) 精液常规检查：是不孕症夫妇首先需要检查的项目。



2、女方检查

- (1) 体格检查及妇科检查，包括常见病原体检查、宫颈筛查等。
- (2) 子宫附件的B超检查。
- (3) 卵巢功能的检查：生殖激素测定，B型超声监测卵泡发育，可辅助基础体温测定。
- (4) 代谢疾病检查：甲状腺功能、糖耐量试验等。
- (5) 输卵管通畅度检查：子宫输卵管超声造影或子宫输卵管X线造影。

