



禅医官方微信号
Official Wechat

地址：广东省佛山市石湾三友南路3号
官方网站：www.fscyy.com
参考资料：眼科护理学（第九章，84-87页）
吴素虹 卢素芬（2007.10）



制定日期：2017年5月
编码：YKZX-折页-中文-006-01

眼科中心制作

泪道疾病




咨询专线：0757-82263333



佛山市禅城中心医院
Foshan Chancheng Central Hospital

什么是泪道阻塞? >>

泪道阻塞是一种常发生在泪点，泪小管，泪囊与鼻泪管交界处以及鼻泪管下口，以溢泪为主要症状的疾病。




泪道阻塞常用检查方法? >>

泪道冲洗试验：用盛有生理盐水的注射器连接冲洗针头自泪点进入泪小管注入生理盐水，根据液体排出情况来判断泪道阻塞或狭窄部位的方法。精确的识别出阻塞部位则可采用泪道注入碘油，做X光照片。

泪道阻塞治疗方法? >>

- 1、探通置管
- 2、阻塞切开。
- 3、鼻泪道再通术
(道义管植入)
- 4、鼻腔泪囊吻合术



向鼻泪管推进
1、泪道探针 2、泪囊 3、鼻泪管

泪道阻塞如何预防? >>

1、应提倡勤洗手，避免随意揉眼。提倡流动水洗脸，毛巾、手帕等物品要与他人分开，并经常清洗消毒。

2、禁止到公共区游泳，医务人员在接触患者之后也必须洗手消毒，预防交叉感染。

3、凡工作环境多风、烟尘等刺激物，应改善环境和戴保护眼镜，以防引起结膜炎。

4、对公共场所如浴室、餐厅、游泳池要进行卫生宣传，定期检查和加强管理。

鼻泪道再通术(道义管植入)术后注意事项? >>

患者术后减少剧烈的擤鼻、打喷嚏等动作，避免硅胶管滑脱；不能用力揉眼睛，减少角膜与结膜擦伤，降低感染率；加强眼部卫生，若出现眼部剧烈疼痛与异物感，则要及时复诊；出院后定期来院冲洗泪道；饮食应以易于消化的为主，尽量减少烟酒及辛辣刺激性食物，遵医嘱服药等。

