

5、体温高于37.5℃。


6、正常分娩、流产、刮宫或产后6周内。

术前准备流程 >>

1、月经干净后禁性生活，月经干净后或者月经干净后第2-3天看门诊，化验白带、血常规等，结果无异常后即可开申请预约。

2、一般预约在月经干净后第3-7天行手术。

3、手术当天要有一人陪伴，并要签手术同意书。



禅医官方微信号
Official Wechat

地址：广东省佛山市石湾三友南路3号
官方网站：www.fscyy.com



制作日期：2017年6月
编码：FCK-折页-中文-118-01

	输卵管通液术	X线输卵管造影	超声输卵管显影术
原理	术者凭感觉判断输卵管是否通畅	X线下造影剂显影	B超下造影剂显影
准确率	低	高	高
显影速度	盲通	显影快	显影快
对怀孕影响	下个月即可备孕	避孕3个月	下个月即可备孕

妇产科制作

输卵管通畅检查



咨询专线：0757-82263333



佛山市禅城中心医院
Foshan Chancheng Central Hospital

输卵管通畅检查 >>

不孕不育是当今社会面临的主要医学问题和社会问题之一。输卵管阻塞或输卵管通而不畅是女性不孕的重要原因，约占不孕症的1/2，尤其是二胎时代的来临，输卵管阻塞成为是继发不孕的主要原因。

输卵管通畅试验的主要目的是了解宫腔和输卵管腔的形态及输卵管的阻塞部位。



常见方法有输卵管通液术、子宫输卵管造影术(X线、B超)。

原理 >>

1、输卵管通液术是检查

者通过导管向宫腔内注入液体，根据注液阻力大小、有无回流及注入液体量和患者感觉等判断输卵管是否通畅。此方法操作简单、创伤性小、手术费用经济等，广泛应用于临床。



2、子宫输卵管造影术是通过导管向宫腔及输卵管注入造影剂，行X线透视及摄片（或B超显影下），根据造影剂在输卵管及盆腔内的显影情况了解输卵管是否通畅、阻塞部位及宫腔形态，该检查损伤小，对输卵管阻塞有一定价值诊断。



适应证 >>

1、不孕症，同居未避孕未孕一年以上者，除外排卵因

素不孕和男方精液异常者，疑有输卵管阻塞者，提供诊治参考。

2、输卵管再通术或异位妊娠后备孕者。

3、对输卵管轻度粘连有疏通的作用。

4、确定生殖器畸形的类别。



禁忌症 >>

1、内外生殖器急性炎症或亚急性炎症。

2、月经期或有不规则阴道流血。

3、可疑妊娠。

4、严重的全身性疾病，如心、肺功能异常，不能耐受手术。